

Số: / UBND-KN  
V/v hướng dẫn diệt chuột trên  
cây trồng vụ Xuân 2022

Thuận Lộc, ngày tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Cấp ủy, Ban cán sự các thôn;
- Giám đốc HTX SX Nông nghiệp xã Thuận Lộc.

Trong thời gian qua, sau khi thu hoạch vụ Hè Thu đến nay trên địa bàn không lứt các cánh đồng, do vậy hiện nay tình hình chuột ngoài đồng ruộng và cư trú trong khu dân cư vẫn còn rất nhiều. Dự báo chuột sẽ tiếp tục phát sinh gây hại nặng trên các đối tượng cây trồng, đặc biệt trên cây lúa giai đoạn xuống giống và thời kỳ phân hóa đòng đến thu hoạch.

Để góp phần bảo vệ tốt kết quả sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra ngay từ đầu vụ sản xuất. UBND xã Thuận Lộc hướng dẫn các biện pháp phòng trừ diệt chuột như sau:

### **1. Biện pháp thủ công:**

Là biện pháp đang được áp dụng phổ biến nhất hiện nay và là biện pháp đánh bắt chuột mang lại hiệu quả cao nhất, không ảnh hưởng đến môi trường: Các biện pháp đánh bắt như đào hang, đổ nước hoặc dùng các loại bẫy thủ công như: Bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy dính,... đặt ở các vị trí còn cao chuột trú ẩn khi nước dâng. Đồng thời làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm, gò cao, bờ kênh; phá các ổ chuột, nơi chuột để đào hang trú ngụ nhằm chuẩn bị tốt cho sản xuất lúa vụ Xuân.

Kết hợp với việc thu mua đuôi chuột để động viên nhân dân. Tuyệt đối không được sử dụng xung kích điện để bẫy diệt chuột.

### **2. Biện pháp sinh học:**

- Chú trọng công tác bảo vệ và phát triển các loài thiên địch của chuột bằng các hình thức: Khuyến khích người dân nuôi mèo, bảo vệ rắn, các loài chim...

- Thuốc sinh học: Hoạt chất Alkaloid ( Chiết xuất bằng nước từ cây lá ngón)  
Tên thương mại: Dacu-M; (Đây là thuốc sinh học duy nhất hiện có, nhưng có hạn chế là trong thực tế tỷ lệ ăn môi thấp)

### **3. Biện pháp dùng thuốc hóa học:**

+ Sử dụng thuốc trừ chuột có hoạt chất Bromadiolone, hàm lượng hoạt chất từ 0,005% - 0,006%, là loại bã trộn sẵn với thóc, quy cách đóng gói 50gam/gói, 100 gam/gói: Tên thương mại: Antimice 0,006GB; Broma 0,005 AB...

+ Sử dụng thuốc trừ chuột có hoạt chất: Warfarin, hàm lượng hoạt chất 2%w/w, là loại bã trộn sẵn với thóc, quy cách đóng gói 200 gam/gói. Tên thương mại: Rasger 20DP; Rat-kill 2%DP...

**Lưu ý:** *Cấm sử dụng nhóm thuốc có hoạt chất florua acetate ; Talium compond; ZincPhosphide min 80%*

**4. Cách đặt bả:** Tranh thủ những ngày nắng ráo tiến hành đặt bả, mỗi bả cách nhau 3-5m, trước cửa hang và dọc đường đi lại của chuột, thời điểm đặt bả vào buổi chiều muộn. Sau khi đặt bả phải thu gom chuột chết, bả thừa và thực hiện tiêu hủy, chôn lấp đảm bảo môi trường.

**5. Thời điểm tổ chức các đợt diệt chuột:**

- Giai đoạn chuyển tiếp giữa hai vụ gieo trồng (khi đồng trắng), tốt nhất ở thời kỳ đổ ả, làm đất. Tổ chức ra quân diệt chuột tập trung, đồng loạt, thời điểm này diệt chuột có hiệu quả cao nhất.

- Giai đoạn làm đất lần cuối trước khi gieo cấy, đến trước lúc lúa đứng cái, làm đồng: Đây là thời điểm diệt chuột có kết quả cao vì chuột thiếu thức ăn, thời điểm này ưu tiên sử dụng biện pháp đánh bả thuốc.

- Thời điểm cây lúa bước vào giai đoạn đứng cái làm đồng, là lúc chuột bước vào thời kỳ sinh sản và nuôi con, tuy nhiên giai đoạn này nhiều thức ăn, việc đánh bả hiệu quả sẽ thấp vì vậy giai đoạn này ưu tiên biện pháp đào hang diệt chuột.

- Các thôn, HTX có nhu cầu tập huấn, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột đến các hộ dân thì đăng ký với cán bộ Khuyến nông của xã để tổng hợp báo cáo mở lớp.

Đề nghị Cấp ủy, Ban cán sự các thôn; Giám đốc HTXSX Nông nghiệp Thuận Lộc quan tâm tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, KN;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Văn Sự**